

## Übung 5

Abgabe bis Dienstag, 26.6. 13:45 Uhr

### Aufgabe 11: [Antithetische Variate]

- (a) Betrachten sie einen  $d$ -dimensionalen Zufallsvektor  $X$ , der symmetrisch verteilt bezüglich  $\mu \in \mathbb{R}^d$  ist, und eine Funktion  $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ , sodass  $f(X)$  quadratisch integrierbar ist. Zeigen sie

$$\sigma^2(\tilde{Y}) < \frac{1}{2}\sigma^2(Y) \iff \text{Cov}(f(X), f(2\mu - X)) < 0$$

für die Zufallsvariablen  $Y = f(X)$  und  $\tilde{Y} = f_g(X)$ , wobei  $f_g$  den geraden Anteil von  $f$  bezeichnet.

- (b) Zeigen sie ferner, dass im Fall  $d = 1$  strenge Monotonie von  $f$  hinreichend für  $\sigma^2(\tilde{Y}) < \frac{1}{2}\sigma^2(Y)$  ist.

### Aufgabe 12: [Antithetische Variate]

Betrachten sie für  $\alpha \in (\frac{1}{2}, 1)$  die quadratisch integrierbare Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x^{\alpha-1} \cdot \exp(-x) & \text{für } x \in (0, 1) \\ 0 & \text{für } x = 0. \end{cases}$$

Diese Funktion besitzt eine Singularität in  $x = 0$  und für ihr Integral ist keine explizite Formel bekannt.

- (a) Zeigen sie, dass für eine auf  $[0, 1]$  gleichverteilte Zufallsvariable  $X$

$$\sigma^2(f(X)) \leq \frac{1}{2\alpha - 1}$$

und

$$\sigma^2(f_g(X)) \geq \frac{\exp(-2)}{2 \cdot (2\alpha - 1)} - \frac{1}{\alpha^2}$$

gelten.

- (b) Ist für Werte von  $\alpha$  nahe bei  $\frac{1}{2}$  antithetisches Sampling sinnvoll?

**Aufgabe 13:** [Stratified Sampling]

Bei der praktischen Durchführung der Methode  $M_n^{prop}$  des Stratified Sampling mit proportionalen Wiederholungszahlen betrachten wir zur Schätzung von  $a = E[f(X)]$  das Verfahren

$$M_n^{prop} = \sum_{j=1}^m \left( p_j \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n_j} f(X_i^{(j)}) \right)$$

mit  $n_j = \lceil p_j \cdot n \rceil$  für  $j = 1, \dots, m$ .

(a) Zeigen sie, dass die Zufallsvariablen

$$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sum_{j=1}^m p_j \cdot \sigma_j^2}} \cdot (M_n^{prop} - a)$$

asymptotisch standard-normalverteilt sind.

**Hinweis:** Benutzen sie die Tatsache, dass aus der Verteilungskonvergenz von  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  gegen  $X$  und  $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  gegen  $Y$  die Verteilungskonvergenz von  $(X_n + Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  gegen  $X + Y$  folgt, falls  $X$  und  $Y$  sowie für jedes  $n \in \mathbb{N}$  auch  $X_n$  und  $Y_n$  unabhängig sind.

(b) Konstruieren sie asymptotische Konvergenzintervalle der Form

$$[M_n^{prop} - L_n, M_n^{prop} + L_n]$$

zum Niveau  $1 - \delta$  für  $a$ .